

# DIAGNOSI DIFFERENZIALE DEL DOLORE IN AGOPUNTURA

GIUSEPPE SERAFINI

*Università degli Studi di Roma Tor Vergata*

*Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione (Dir. Prof. G. Leonardis)*

<b>DOLORE</b>	<b>DA</b>	<b>PIENO</b>	Recente	Continuo	ad esordio rapido
---------------	-----------	--------------	---------	----------	-------------------

PIENO	DI	YANG	Acuto	a tipo bruciore o	di strappamento
PIENO	DI	YIN	Sordo	a tipo contrattura con	pesantezza
PIENO	DI	SANGUE	Sordo/lancinante	pulsatile	a tipo pizzicottamento

PIENO	DI	FREDDO	Fisso	Acuto	Profondo	Induito bianco	Polso profondo/teso
PIENO	DI	UMIDO	Fisso	Sensazione di gonfiore	Di pesantezza	Induito bianco spesso	Polso profondo/duro
PIENO	DI	VENTO	Mobile	fugace/erratico	Piuttosto superficiale	Induito sottile	Polso superf./rapido
PIENO	DI	CALDO	Fisso	articolaz. rosse/gonfie	febbre/sete/oppresione	Induito giallo	Polso teso/rapido

<b>DOLORE</b>	<b>DA</b>	<b>VUOTO</b>	Cronico	Intermittente	ad esordio lento/graduale
---------------	-----------	--------------	---------	---------------	---------------------------

VUOTO	DI	YANG	Sordo	Costrittivo	a tipo pesantezza
VUOTO	DI	YIN	Acuto	Urente	a tipo strappamento
VUOTO	DI	SANGUE	Acuto	molto sensibile al vento e	al freddo

<b>DOLORE</b>	<b>DA</b>	<b>STASI</b>	Si manifesta a riposo o	all'inizio del movimento
---------------	-----------	--------------	-------------------------	--------------------------

STASI	DI	YANG	Acuto	Presente nella II parte della notte o al risveglio	Migliora rapidamente con il movimento
STASI	DI	YIN	Sordo a contrattura	Presente nella II parte della giornata	Migliora all'inizio della sera
STASI	DI	SANGUE	A tipo pizzicottamento	o a tipo pugnalata	